


Artsen zakkaartje Verenso richtlijn 'Urinerweginfecties bij kwetsbare ouderen (2018)'




* **Koorts:** eenmalige tympane temperatuur >37.8 / rectale temperatuur >38.1, of herhaalde tympane temperatuur >37.2 / rectale temperatuur >37.5. NB: in geval van twijfel verdient rectale temperatuurmeting steeds de voorkeur.

** **Delier:** definitie volgens DSM-5.

*** **Actief monitoren:** monitoren van vitale functies, aandacht voor vochthuishouding en herhaaldelijk lichamelijk onderzoek.

DISCLAIMER: DEZE BESLISBOOM IS MET GROTE ZORGVULDIGHEID ONTWIKKELD. DE ADVIEZEN DIE VOLGEN UIT DE BESLISBOOM ZIJN CONFORM DE ADVIEZEN UIT DE VERENSO RICHTLIJN 'URINEWEGINFECTIES BIJ KWETSBAAR OUDEREN' (2018). DEZE BESLISBOOM KAN INGEZET WORDEN ALS HULPMIDDEL. U BLIJFT ALS ARTS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET NEMEN VAN EEN BEHANDELBESSLISSING.

Artsen zakkaartje Verenso richtlijn 'Urinary tract infections bij kwetsbare ouderen (2018)'



Heeft patiënt ÉÉN OF MEER van de volgende symptomen (ONGEACHT DE UITSLAG VAN URINE ONDERZOEK)?

Urine: verandering in kleur en/of geur, troebele urine, macroscopische hematurie (ongeacht of patiënt anticoagulantia gebruikt of niet)

Urogenitaal: nycturie, verminderde urineproductie, prostaatpijn, scrotumpijn, suprapubische pijn, urineretentie

Mentaal: agitatie/agressie (nieuw/verergerd), verandering in mentale status (zonder klinische verdenking op delier**), niet zichzelf zijn ('anders dan anders')

Gastro-intestinaal: verminderde vochtintake/voedingsintake, misselijkheid (met of zonder braken), diarree

Overig: algehele malaise, vermoeidheid (nieuw/verergerd), algehele zwakte (nieuw/verergerd), duizeligheid (nieuw/verergerd), syncope, verminderd functioneren (ADL), verminderde mobiliteit